

| 定期予防接種一覧表                                          |                                                                   |                             |                            |            |                                                                                                                       |                                                            | (令和7年4月1日現在) |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 予防接種名                                              |                                                                   | 標準的な接種期間                    |                            | 接種回数       | 接種間隔                                                                                                                  | 対象年齢<br>(無料で受けられる期間)                                       |              |  |
| ロタウイルス感染症<br>①・②どちらかのワクチンで<br>必要回数接種する             | ①<br>ロタリックス                                                       | 初回接種は<br>生後2か月～出生14週6日後までの間 |                            | 2回         | 27日以上の間隔をあけて2回                                                                                                        | 出生6週0日後～<br>出生24週0日後                                       |              |  |
|                                                    | ②<br>ロタテック                                                        | 初回接種は<br>生後2か月～出生14週6日後までの間 |                            | 3回         | 27日以上の間隔をあけて3回                                                                                                        | 出生6週0日後～<br>出生32週0日後                                       |              |  |
| H i b感染症 ※1<br>(インフルエンザ菌 b 型)                      |                                                                   | 初回                          | 生後2～7か月未満                  | 3回         | 27(20)日以上の間隔をあけて3回                                                                                                    | 生後2か月～<br>1歳未満                                             |              |  |
|                                                    |                                                                   | 追加                          | 初回終了後7～13 か<br>月の間隔をおく     | 1回         | 初回終了後、7か月以上の間隔をあけて1回<br>(1歳までに3回終了せずに行う場合は初回接種終<br>了後27(20)日以上の間隔をあけて1回)                                              | 5歳未満                                                       |              |  |
| 小児の肺炎球菌感染症 ※2<br>(15価)(20価)                        |                                                                   | 初回                          | 生後2～7か月未満                  | 3回         | 27日以上の間隔をあけて3回<br>(2回目が1歳を超えた場合、3回目の接種はしない)                                                                           | 生後2か月～<br>2歳未満                                             |              |  |
|                                                    |                                                                   | 追加                          | 生後12～15か月未満                | 1回         | 初回終了後、60日以上の間隔をあけて1回                                                                                                  | 1歳～5歳未満                                                    |              |  |
| ジフテリア(D)<br>百日せき(P)<br>破傷風(T)<br>ポリオ(IPV)<br>H i b | ・5種混合<br>(DPT-IPV-<br>Hib)<br>・4種混合<br>(DPT-IPV)<br>・二種混合<br>(DT) | 1期初回                        | 生後2か月～<br>1歳未満             | 3回         | 20日以上の間隔をあけて3回                                                                                                        | 生後2か月～<br>7歳6か月未満                                          |              |  |
|                                                    |                                                                   | 1期追加                        | 1期初回終了後、12<br>～18 か月の間隔をおく | 1回         | 初回3回終了後、6か月以上の間隔をあけて1回                                                                                                |                                                            |              |  |
|                                                    |                                                                   | 2期                          | 小学校6年生                     | 1回         |                                                                                                                       | 11歳～13歳未満                                                  |              |  |
| B型肝炎                                               |                                                                   |                             | 生後2～9か月                    | 3回         | 27日以上の間隔をあけて2回接種した後、第1回<br>目の注射から139日以上の間隔をあけて1回                                                                      | 1歳未満                                                       |              |  |
| 結核(BCG)                                            |                                                                   |                             | 生後5～8か月                    | 1回         |                                                                                                                       | 1歳未満                                                       |              |  |
| 麻しん・風しん(MR)                                        |                                                                   | 1期                          | できるだけ早期                    | 1回         |                                                                                                                       | 1歳～2歳未満                                                    |              |  |
|                                                    |                                                                   | 2期                          | できるだけ早期                    | 1回         |                                                                                                                       | 小学校入学前<br>1年間                                              |              |  |
| 水痘(みずぼうそう)                                         |                                                                   | 1回目                         | 生後12～15か月                  | 1回         | 3か月以上の間隔をあけて2回                                                                                                        | 1歳～3歳未満                                                    |              |  |
|                                                    |                                                                   | 2回目                         | 1回目の接種後、6～<br>12か月の間隔をおく   | 1回         |                                                                                                                       |                                                            |              |  |
| 日本脳炎 ※3                                            |                                                                   | 1期初回                        | 3～4歳                       | 2回         | 6日以上の間隔をあけて2回                                                                                                         | 生後6か月～<br>7歳6か月未満                                          |              |  |
|                                                    |                                                                   | 1期追加                        | 4～5歳                       | 1回         | 初回2回終了後、6か月以上の間隔をあけて1回                                                                                                |                                                            |              |  |
|                                                    |                                                                   | 2期                          | 9～10歳                      | 1回         | 1期追加から、おおむね5年が望ましい                                                                                                    | 9歳～13歳未満                                                   |              |  |
| ヒトパピローマウイルス<br>感染症(子宮頸がん予防)<br>(女子のみ)              |                                                                   | サーバリッ<br>クス(2価)             | 中学1年生                      | 3回         | ・1か月以上の間隔をあけて2回<br>・3回目は初回から5か月以上で、2回目から2<br>か月半以上の間隔をあける                                                             | 小学6年生の年度<br>の初日～<br>16歳になる年度の<br>末日(高校1年生<br>の年度末)まで<br>※4 |              |  |
|                                                    |                                                                   | ガーダシル<br>(4価)               |                            |            | ・1か月以上の間隔をあけて2回<br>・3回目は2回目から3か月以上の間隔をあける                                                                             |                                                            |              |  |
|                                                    |                                                                   | シルガード9<br>(9価)              |                            | 3回<br>(2回) | ①3回接種の場合<br>・2か月の間隔をあけて2回<br>・3回目は1回目から6か月以上の間隔をあける<br>②2回接種の場合(15歳未満で1回目の接種を受け<br>る場合は2回の接種で完了可能)<br>・6か月以上の間隔をあけて2回 |                                                            |              |  |

※1※2 生後7か月以降に接種開始された方は接種回数等が異なります。ご不明な場合はお問い合わせください。

※3 平成19年4月1日以前に生まれた方は対象年齢の範囲が異なります。ご不明な場合はお問い合わせください。

※4 平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれ的女子で、令和7年3月31日までに1回以上接種を開始された方は、令和8年3月31日まで無料で接種できます。

○異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔

上記以外でも、異なった種類の注射の生ワクチンを接種する場合には、次の通りの間隔を守ることが必要です。

| ワクチンの種別   | ワクチンの種類                            | 異なる注射の生ワクチンを接種する場合にあける間隔 |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|
| 生ワクチン(注射) | 麻しん・風しん(MR)、BCG、水痘(水ぼうそう)、おたふくかぜなど | 接種した日の翌日から数えて27日以上あける    |

(例) 10月1日にMRを接種した後、別日に水痘の予防接種を受ける場合は、27日以上の間隔をあけて接種します(この場合は、10月29日から接種可能です)。